

Réunion de la Fédération des UCOG organisée par la
commission SoFOG des UCOG

Utilisation des scores des risques Etat des lieux

Véronique Bourcy,
Commission des UCOG
de la SoFOG



Commission de la Sofog
des représentants des UCOG

19/09/2018



Contexte

- Existences de nombreux scores de risques
 - Chimiothérapie
 - chirurgie

- Etats des lieux :
 - ✓ La connaissance
 - ✓ Leur utilisation
 - ✓ Leur intérêt

Méthodologie

➤ Deux questionnaires en ligne en parallèle

Risque de toxicité
à la chimiothérapie



→ Mail aux oncologues

Risque
à la chirurgie



→ Mail aux chirurgiens

Envoyé par les UCOG/UCOGIR/AOG

- La connaissance
- L'intérêt
- L'utilisation



Résultats

➤ Répondants :

Risque de toxicité
à la chimiothérapie

88 réponses


Risque
à la chirurgie

112 réponses

Résultats


➤ Connaissance :

Je connais des scores de risque de toxicité à la chimiothérapie



68% des oncologues
répondant ne connaissent
pas de score de risque



Je connais des scores de risque chirurgical



58% des chirurgiens
répondant ne connaissent
pas de score de risque

Résultats

➤ Connaissance :




Autres : G8 (4), Pronopall (3), charlson (1), CIRS (1), Lee (1), PINI (1), MTEV (1), Glasgow pronostic score (1)

Autres : AFC (5), Euroscore/Thorascore (3), ASA (3), Charlson (2), Renal score (2)

Résultats


➤ Utilisation:

Avant de décider d'une chimiothérapie chez les PA , j'utilise un score de risque



■ Jamais
■ Rarement
■ Souvent
■ Toujours

Avant de décider d'une intervention chirurgicale chez une PA, j'utilise les score de risque



■ Jamais
■ Rarement
■ Souvent
■ Toujours

$\frac{3}{4}$ des oncologues répondants n'en utilisent jamais ou rarement


$\frac{3}{4}$ des chirurgiens répondants n'en utilisent jamais ou rarement



Résultats


➤ Utilisation:

Tests utilisés



60% des oncologues répondants utilisent dans ce cas le CRASH test

Tests utilisés




20% des chirurgiens répondant utilisent dans ce cas l'ASC-NQUIP
*Autres : Charlson (2), G8 (2), Thorascope (2)
Epithor (1), Euroscope (1)*



Résultats

➤ Utilisation:


Le résultat du test influence ma décision



■ Rarement
■ Souvent
■ Toujours

$\frac{3}{4}$ des oncologues répondants modifient souvent leur traitement au vu des résultats du score

Le résultat du test influence ma décision



■ Rarement
■ Souvent
■ Toujours

50% des chirurgiens répondant modifient souvent leur projet d'intervention vu des résultats du score



Résultats

➤ Utilisation:

Parmi les oncologues répondant qui n'utilisent pas de sore de risque:

- pas performant : 1
- pas d'intérêt : 4

Parmi les chirurgiens répondant qui n'utilisent pas de sore de risque:

- pas l'habitude : 1
- pas performant : 2
- pas d'intérêt : 5



Conclusions

Conclusions

- ✓ Peu connus / peu utilisés
- ✓ Peu d'homogénéité
- ✓ Ceux qui utilisent en sont satisfaits

Limites : peu de réponses

Perspectives :

- ✓ Poursuite ?
- ✓ Travailler sur un score ?
- ✓ ?