


# TUMEURS DES LÈVRES, DE LA CAVITÉ BUCCALE ET DU PHARYNX

## 1. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 2002-2007

**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx : Évolution du nombre de séjours POUR et AVEC tumeur réalisés en région Centre (2002-2007)**




SOURCE : PMSI 2002-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

Le nombre annuel de séjours de Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx réalisés en région Centre a augmenté de 15.2 % entre 2002 et 2007.


La part des séjours POUR Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx est passée de 57 % en 2002 à 64.6 % en 2007.

**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Évolution par type de prise en charge des séjours réalisés en région Centre (2002-2007)**




SOURCE : PMSI 2002-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Évolution des taux de fuites et d'attractivité de la région Centre (2002-2007)**



SOURCE : PMSI 2002-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR

**Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Évolution du nombre de patients en région Centre (2002-2007)**



SOURCE : PMSI 2002-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Le nombre annuel de patients atteints de cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx pris en charge a augmenté de 2.7 % entre 2002 et 2007, soit + 30 patients, avec un pic en 2005.

Le nombre annuel de nouveau cas de Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx pris en charge a diminué de -8 % entre 2005 et 2007, avec un creux en 2006.

En région Centre, l'incidence standardisée sur l'âge du Cancer bouche est passée de 43 pour 100 000 adultes en 2005 à 39 pour 100 000 adultes en 2007. L'année 2005 constituait une année « forte ».

## 2. SÉJOURS RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE (2006-2007)

### *Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Séjours répartis selon le type de tumeur (2006-2007)*

		2006		2007	
		Nb séjours	%	Nb séjours	%
Pour tumeur	Tumeurs malignes	4 992	82,6	4 565	88,7
	Tumeurs in situ ou à évolution imprévisible	83	1,4	56	1,1
Avec tumeur	Tumeurs malignes	952	15,8	505	9,8
	Tumeurs in situ ou à évolution imprévisible	17	0,3	21	0,4
<b>Total</b>		<b>6 044</b>	<b>100,0</b>	<b>5 147</b>	<b>100,0</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

89.8 % des séjours de tumeur réalisés en 2007, dans des établissements de la région Centre, étaient des séjours POUR tumeur.

Les tumeurs in situ ou à évolution imprévisible représentaient 1.5 % des séjours.

### *Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Séjours répartis selon le type d'établissement (2006-2007)*

	2006		2007		2006		2007	
	Nb séjours	%	Nb séjours	%	Nb journées	%	Nb journées	%
Établissements publics	2 784	46,1	2 702	52,5	16 508	70,5	15 284	71,0
Établissements privés	3 260	53,9	2 445	47,5	6 905	29,5	6 250	29,0
<b>Total</b>	<b>6 044</b>	<b>100,0</b>	<b>5 147</b>	<b>100,0</b>	<b>23.413</b>	<b>100,0</b>	<b>21 534</b>	<b>100,0</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

De 2006 à 2007, le nombre de séjours a varié de -897 séjours (soit -14.8 %) et le nombre de journées d'hospitalisation a varié de -1879 journées (soit -8 %).

En 2007, les établissements publics de santé ont réalisé 52.5 % de l'activité 'Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx' en terme de séjours et 71 % en terme de journées d'hospitalisation.

La part des établissements publics de santé a varié de 6.4 points (en nombre de séjours) de 2006 à 2007.

**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Séjours répartis selon le type d'hospitalisation (2006-2007)**

	2006		2007		2006		2007	
	Nb séjours	%	Nb séjours	%	Nb journées	%	Nb journées	%
Hospitalisation > 24 h	2 288	37,9	2 122	41,2	19 657	84,0	18 509	86,0
Hospitalisation < 24 h	3 756	62,1	3 025	58,8	3 756	16,0	3 025	14,0
<b>Total</b>	<b>6 044</b>	<b>100,0</b>	<b>5 147</b>	<b>100,0</b>	<b>23 413</b>	<b>100,0</b>	<b>21 534</b>	<b>100,0</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

Les hospitalisations de moins de 24 heures représentaient 58.8 % des séjours et 14 % des journées d'hospitalisation en 2007.

La part des hospitalisations de moins de 24 heures a varié de -3.3 points de 2006 à 2007.

**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Durée moyenne de séjours des établissements de la région Centre (2006-2007)**

	2006		2007	
	DMS (en journées)	Médiane	DMS (en journées)	Médiane
Hospitalisation > 24 h	8,6	5	8,7	4
Tous les séjours	3,9	1	4,2	1

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

La DMS des hospitalisations de plus de 24 heures a varié de 0.1 jours entre 2006 et 2007.

**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Séjours des établissements de la région Centre répartis selon le type de prise en charge (2006-2007)**


	2006		2007		2006		2007	
	Nb séjours	%	Nb séjours	%	Nb journées	%	Nb journées	%
Séjours chirurgicaux	583	9,6	573	11,1	5852	25,0	5 850	27,2
Séjours médicaux	5 461	90,4	4 574	88,9	17 561	75,0	15 684	72,8
<i>dont avec chimiothérapie</i>	3 498		3 397		6 215		7 389	
<b>Total</b>	<b>6 044</b>	<b>100,0</b>	<b>5 147</b>	<b>100,0</b>	<b>23 413</b>	<b>100,0</b>	<b>21 534</b>	<b>100,0</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

Les séjours avec chimiothérapie représentaient 66 % des séjours et 34.3 % des journées d'hospitalisation en 2007.

Les séjours chirurgicaux représentaient 11.1 % des séjours et 27.2 % des journées d'hospitalisation en 2007.

**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Nombre de journées d'hospitalisation  
Dans les 20 premiers établissements de la région Centre (2006-2007)**




SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

Tri par ordre décroissant de journées en 2007

Les 20 premiers établissements de la région ont réalisé, en 2007, 92.9 % des journées d'hospitalisation.  
Le CHU de Tours et le CHR d'Orléans ont réalisé 31.6 % des journées d'hospitalisation.

**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Journées d'hospitalisation dans les 20 premiers établissements de la région Centre réparties selon le type de prise en charge (2007)**



SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

Les chiffres présents sur les barres représentent le nombre de journées d'hospitalisation.

Tri par ordre décroissant de pourcentage de journées de séjours chirurgicaux.

Parmi ces établissements :

La part des journées de séjours chirurgicaux en 2007 variait de 81.7 % (Clinique du Saint Cœur) à 0.5 % (CH de Vierzon).

La part des journées de séjours pour chimiothérapie en 2007 variait de 77.3 % (Notre Dame de Bon Secours) à 1.3 % (CH de Châteaudun).

### 3. TAUX DE FUITES ET D'ATTRACTIVITÉ PAR DÉPARTEMENT (2007)

**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Séjours des patients hospitalisés et/ou domiciliés en région Centre (2006-2007)**


		Nombre de séjours	
		2006	2007
Séjours réalisés en région Centre	Patients de la région Centre	5.823	4.957
	Patients hors région Centre	221	190
Séjours réalisés hors région	Patients de la région Centre	763	714

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR

L'activité hospitalière (publique et privée) de la région Centre pour la prise en charge de patients présentant une Tumeurs bouche était de 5147 séjours en 2007.

L'activité hospitalière (publique et privée) liée à la prise en charge, en France, de patients domiciliés en région Centre et présentant une Tumeurs bouche était de 5671 séjours en 2007.


**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Taux de fuites et d'attractivité par département (2007)**



SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR

Le taux de fuites de la région Centre était de 12.6 % en 2007 (de 3.3 % en Indre-et-Loire à 21.4% en Loiret).

Le taux d'attractivité de la région Centre était de 3.7 % en 2007 (de 0.3 % en Indre à 10.5 % en Eure-et-Loir).


**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Taux de fuites par type d'activité (2007)**

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR

Le taux de fuites pour chimiothérapie était de 8.3 % et celui pour chirurgie était de 23 %

Le taux de fuites le plus élevé pour les séjours pour chimiothérapie concernait le Loiret (20.1 %).

Le taux de fuites le plus élevé pour les séjours chirurgicaux concernait l'Eure-et-Loir (37.3 %).


**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Les 15 premiers établissements accueillant les séjours de fuites des patients domiciliés en région Centre (2007)**

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR


Ces 15 établissements ont accueilli 79.4 % des séjours de fuites.

**Tumeurs des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Répartition des séjours de fuites par département (2007)**


**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés dans le Cher**




**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés en Eure et Loir**




**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés en Indre**



**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés en Indre et Loire**




**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés dans le Loir et Cher**



Part des séjours des patients domiciliés dans le Loir et Cher (en %)   
 <1 (diagonal lines) 1-5 (light green) 10-15 (medium green) 80.1 (dark green)

**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés dans le Loiret**



Part des séjours des patients domiciliés dans le Loiret (en %)   
 <1 (diagonal lines) 1-5 (light green) 5-10 (medium green) 75 (dark green)

SOURCE : PMSI 2002-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR

## 4. PATIENTS DOMICILIES EN RÉGION CENTRE (2006-2007)

Étude réalisée à partir du chaînage des séjours POUR Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx des patients domiciliés en région Centre, quelque soit le lieu d'hospitalisation. En 2006-2007, 98 % des séjours ont pu être chaînés.

### **Cancer bouche : Patients hospitalisés POUR Cancer bouche et domiciliés en région Centre (2006-2007)**

	2006	2007
Nombre de patients pris en charge POUR cancer	1 149	1 161
Nombre de nouveaux patients	-	814

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Sur les deux années, la file active comprenait 1 992 patients distincts.

Au cours des deux années, parmi ces patients, il y a eu 250 décès à l'hôpital (12.6 % des patients).

Il y avait 1 593 hommes et 399 femmes, d'où un sexe-ratio de 4.

La moyenne d'âge des nouveaux patients, au moment de leur première hospitalisation POUR cancer, était de 62.4 ans. La médiane était de 61 ans.


La part des patients présentant, lors de leur première hospitalisation, des métastases était de 11.2 %.

### **Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Répartition des patients selon leur département de résidence (2006-2007)**

	2006	2007
18 - Cher	196	206
28 - Eure et Loir	150	184
36 - Indre	141	114
37 - Indre et Loire	223	251
41 - Loir et Cher	175	173
45 - Loiret	264	233
<b>Région Centre</b>	<b>1 149</b>	<b>1 161</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

**Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Prévalence (pour 100 000 adultes) standardisée sur l'âge par département de résidence (2006-2007)**



SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Population de référence : la population française, 1999.

La prévalence standardisée du Cancer bouche, en 2007, était de 57 pour 100 000 adultes en région Centre.

La prévalence standardisée du Cancer bouche, en 2007, variait de 47 pour 100 000 adultes (Loiret) à 71 pour 100 000 adultes (Cher).

**Cancer bouche : Prise en charge moyenne par patient hospitalisé POUR cancer et domicilié en région Centre, selon le département de résidence (2007)**

	Nb patients	Nb moyen d'hospitalisations	Nb moyen d'hospitalisations <24h	Nb moyen de journées	Part des patients avec chimio (%)	Nb moyen journées de chimio quand chimio	Part des patients avec chirurgie (%)	Nb moyen journées de chir quand chir
<b>18 - Cher</b>	347	4,1	3,2	18,9	52,2	14,7	50,1	13,8
<b>28 - Eure et Loir</b>	286	5,5	4,8	16,8	61,2	15,7	55,6	9,3
<b>36 - Indre</b>	229	5,1	4,1	18,1	59,4	13,7	44,5	15,1
<b>37 - Indre et Loire</b>	404	5,1	3,3	18,0	53,5	17,9	48,0	13,5
<b>41 - Loir et Cher</b>	303	6,6	6,4	19,2	56,1	17,2	51,8	11,3
<b>45 - Loiret</b>	423	4,8	3,7	17,5	59,1	14,6	52,2	11,7
<b>Région Centre</b>	1 992	5,1	4,1	18,1	56,6	15,7	50,6	12,3

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Sur les deux années, par patient :

Le nombre moyen d'hospitalisations était de 5.1 (4.1 à 6.6 selon le département) dont 4.1 hospitalisations < 24H.

Le nombre moyen de journées d'hospitalisation était de 18.1 (16.8 à 19.2 selon le département).

56.6 % des patients ont été traités par chimiothérapie et 50.6 % par chirurgie.

25.4 % des patients ont été traités par chirurgie ET chimiothérapie.

Sur les deux années, la part des patients présentant des métastases était de 25.9 %.


## 5. NOUVEAUX PATIENTS DE 2007 : LA PREMIÈRE HOSPITALISATION

### **Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Répartition des nouveaux patients selon leur département de résidence (2007)**

	2007
18 - Cher	146
28 - Eure et Loir	131
36 - Indre	83
37 - Indre et Loire	173
41 - Loir et Cher	123
45 - Loiret	158
<b>Région Centre</b>	<b>814</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

### **Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Incidence (pour 100 000 adultes) standardisée sur l'âge par département de résidence (2007)**



SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Population de référence : la population française, 1999.

L'incidence standardisée du Cancer bouche, en 2007, était de 39 pour 100 000 adultes en région Centre.

L'incidence standardisée du Cancer bouche, en 2007, variait de 32 pour 100 000 adultes (Loiret) à 50 pour 100 000 adultes (Cher).


**Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Les 15 premiers établissements dans lesquels ont lieu les premières hospitalisations POUR cancer (2007)**

	Nb séjours	%
37 - CHU DE TOURS	123	15,1
45 - CHR ORLEANS	62	7,6
18 - CLINIQUE GUILLAUME DE VARYE	45	5,5
41 - CLINIQUE SAINT COME SAINT DAMIEN	40	4,9
18 - CH J COEUR BOURGES	35	4,3
28 - CH DE DREUX	35	4,3
37 - PSLV	33	4,1
94 - INSTITUT GUSTAVE ROUSSY	28	3,4
36 - CH DE CHATEAUROUX	27	3,3
37 - ALLIANCE	24	2,9
75 - AP-HP HOPITAUX DE PARIS	21	2,6
41 - CLINIQUE DU SAINT COEUR	20	2,5
36 - CL MED OBS CHIR"ST FRANCOIS"	18	2,2
41 - CH DE BLOIS	16	2,0
45 - CH AGGLOMERATION MONTARGOISE	16	2,0

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Ces quinze premiers établissements de santé ont pris en charge, en 2007, 67.4 % des nouvelles hospitalisations POUR cancer.

**Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Répartition par âge des nouveaux patients hospitalisés POUR cancer et domiciliés en région Centre (2007)**



SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

La moyenne d'âge des nouveaux patients, au moment de leur première hospitalisation POUR cancer, était de 62.4 ans. La médiane était de 61 ans.

## 6. NOUVEAUX PATIENTS DU 1ER SEMESTRE 2007 : 6 PREMIERS MOIS DE SUIVI

Étude des 6 premiers mois de suivi des nouveaux patients du premier semestre 2007.

### Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: Fuite des nouveaux patients du 1er semestre 2007 hospitalisés POUR cancer et domiciliés en région Centre (2007)

Patients pris en charge :		%
Entièrement hors région	54	12,5
Entièrement en région	343	79,6
Mixte	34	7,9
<b>Total</b>	<b>431</b>	<b>100,0</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Les 6 premiers mois de suivi d'un cancer se sont déroulés :

- exclusivement en région Centre dans 79.6 % des cas,
- exclusivement HORS région Centre dans 12.5 % des cas.

### Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx : Prise en charge moyenne par nouveau patient hospitalisé POUR cancer et domicilié en région Centre, selon le département de résidence (2007)

	Nb patients	Nb moyen d'hospitalisations	Nb moyen d'hospitalisations <24h	Nb moyen de journées	Part des patients avec chimio (%)	Nb moyen journées de chimio quand chimio	Part des patients avec chirurgie (%)	Nb moyen journées de chir quand chir
<b>18 - Cher</b>	81	4,3	2,1	19,6	54,3	11,5	44,4	14,1
<b>28 - Eure et Loir</b>	73	6,1	3,2	19,8	63,0	11,5	56,2	7,9
<b>36 - Indre</b>	40	5,6	2,8	24,8	55,0	7,5	55,0	18,6
<b>37 - Indre et Loire</b>	82	6,2	2,8	22,8	59,8	17,7	46,3	9,4
<b>41 - Loir et Cher</b>	66	5,8	4,1	17,8	50,0	16,1	51,5	9,6
<b>45 - Loiret</b>	89	4,7	2,0	16,9	58,4	10,4	49,4	10,4
<b>Région Centre</b>	<b>431</b>	<b>5,4</b>	<b>2,8</b>	<b>19,9</b>	<b>57,1</b>	<b>12,8</b>	<b>49,9</b>	<b>11,1</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Sur un suivi de 6 mois, par patient :

Le nombre moyen d'hospitalisations était de 5.4 (4.3 à 6.2 selon le département) dont 2.8 hospitalisations < 24H.

Le nombre moyen de journées d'hospitalisation était de 19.9 (16.9 à 24.8 selon le département).

57.1 % des patients ont été traités par chimiothérapie et 49.9 % par chirurgie.

23.2 % des patients ont été traités par chirurgie ET chimiothérapie.

Au cours d'un suivi de 6 mois après une 1ère hospitalisation, la part des patients présentant des métastases était de 23.4 %.

**Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx: les 20 premiers actes chirurgicaux les plus fréquents au cours des 6 premiers mois de suivi des nouveaux patients du 1er semestre 2007**

<i>Actes chirurgicaux</i>	<i>Nb séjours</i>
EBLA003 Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable sous-cutané	59
FCFA008 Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, par cervicotomie	39
ZZHA001 Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané	29
FCFA013 Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet bilatéral, par cervicotomie	27
GEQE013 Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie	27
GLLD015 Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures	26
ZZNL031 Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau	22
HAF A006 Pelviglossectomie de langue mobile, par abord intrabuccal	14
HAF A023 Glossectomie partielle de langue mobile, par abord intrabuccal	13
QAMA002 Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"]	13
FCFA016 Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel unilatéral, par cervicotomie	12
HFC A002 Gastrostomie cutanée, par laparotomie	12
HEQE002 Endoscopie œso-gastro-duodénale	11
HAF A020 Exérèse transfixiante de lésion de lèvre, ou exérèse d'une commissure labiale	10
FAFA014 Amygdalectomie par dissection	8
HDFA002 Oropharyngectomie latérale avec amygdalectomie, par abord intrabuccal	8
GELE001 Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale	7
HAF A026 Pelvi-glosso-mandibulectomie non interromptrice, par abord cervicofacial	7
HDFA005 Pharyngolaryngectomie totale	7
HCFA009 Parotidectomie totale avec dissection et conservation du nerf facial	6
FCFA020 Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel bilatéral, par cervicotomie	5
FCFA025 Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral avec curage partiel controlatéral, par cervicotomie	5
HAF A017 Pelvi-glosso-mandibulectomie interromptrice, par abord cervicofacial	5
HAMA027 Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané local	5
HDFA019 Oropharyngectomie par mandibulotomie	5
QZMA009 Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané, musculaire, musculocutané ou ostéo-musculo-cutané, à pédicule définitif	5
ZZLP025 Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1	5
FCFA028 Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du cou à visée thérapeutique, par cervicotomie	4
GEQE007 Fibroscopie bronchique	4
HAF A027 Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial	4
HDQE001 Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe	4
HGLA001 Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie	4
QAMA013 Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau musculaire ou musculocutané	4
FCFA027 Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, élargi aux muscles profonds et/ou aux nerfs du cou, à l'artère carotide externe, à la glande parotide, par cervicotomie	3
GES A002 Fermeture de trachéotomie	3

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE